

CDC Vital Signs

Detenga las infecciones por *C. difficile*

(Stop *C. difficile* Infections)

[Locutor] Este programa es una presentación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

La bacteria *Clostridium difficile* o *C. difficile* causa diarrea y está asociada a 14,000 muertes anuales en los Estados Unidos. Las personas que reciben atención médica y toman antibióticos tienen mayor riesgo de infectarse, especialmente si son de edad avanzada. Detectar en forma temprana la infección por *C. difficile* y detener su propagación puede salvar vidas.

Estas son seis medidas para la prevención en entornos médicos:

Primero: Prescriba antibióticos solo cuando sea necesario.

Segundo: Haga pruebas de detección de la *C. difficile* si los pacientes tienen diarrea en los meses siguientes a un tratamiento con antibióticos.

Tercero: Aísle a las personas con resultados positivos a las pruebas.

Cuarto: Debido a que el lavado de las manos y el uso de limpiadores de manos no es suficiente para eliminar las esporas de *C. difficile*, use guantes y batas cuando atienda a los pacientes infectados.

Quinto: Desinfecte las áreas de tratamiento con productos eficaces para matar la *C. difficile* y

Sexto: Si se transfiere a los pacientes, notifique al nuevo establecimiento de la infección por *C. difficile*.

Infórmese más en www.cdc.gov/vitalsigns.

[Locutor] Para obtener la información de salud más precisa visite www.cdc.gov/español o llame a cualquier hora al 1-800-CDC-INFO, es decir, 1-800-232-4636.